Un paro cardíaco ocurre cuando el corazón funciona mal y deja de latir por sí mismo. Esto es provocado por un problema eléctrico en el corazón que causa un latido cardíaco anormal (arritmia). Cuando su acción de bombeo se interrumpe, el corazón no puede bombear sangre al cerebro, a los pulmones y a otros órganos.

Algunos segundos después, la persona deja de responder, no respira o tan solo boquea. Si la persona no recibe tratamiento inmediatamente, la muerte puede sobrevenir en unos pocos minutos.

En Estados Unidos cada año ocurren más de 350,000 paros cardíacos fuera de los hospitales.

¿Es lo mismo un ataque cardíaco que un paro cardíaco?

No. Aunque un ataque cardíaco puede causar un paro cardíaco, no son lo mismo.

Un ataque cardíaco es causado por un problema circulatorio. Los ataques cardíacos son provocados por un bloqueo que i k²sk~k k{ Á³y¢ ¯^~q³u~k¢ ^{ g¢®^¾£~Ù

El paro cardíaco es causado por un problema eléctrico en el g¢®^¾£~Ù .{ g¢®^¾£~ i ky^ i k {^²s® g¢®®kg²^ } k~²k » {^ p³~gs£~ i k f¢ } fk¢ i k{ g¢®^¾£~ ª^®^Ù

Tanto el ataque cardíaco como el paro cardíaco son k } k®qk~gs^¯ } l i sg^¯ » ®k¬³sk®k~ ²®^²^ } sk~²¢ } l i sg¢ inmediato.

¿Cuál es la causa un paro cardíaco?

=^ } ^»¢®u^ i k {¢¯ ª^®¢¯ g^®i u^g¢¯ ¯¢~ g^³¯^i ¢¯ ª¢® ®s² } ¢¯ cardíacos anormales llamados taquicardia ventricular o À f®s{^gs£~ ¸k~²®sg³{^®Ù

B²®¢¯ p^g²¢®k¯ ¬³k ª³k i k~ ^³ } k~²^® k{ ®sk¯q¢ i k ª^®¢ cardíaco, o desatarlo, son:

- *^®i s¢ } s¢ª^²u^ è } ´¯g³{¢ g^®i u^g¢ k~q®¢¯^i ¢é
- Ciertos medicamentos
-

(continuado)

© Derechos de autor 2024 American Heart Association, Inc., una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3). Todos los derechos reservados. Se prohíbe todo uso no autorizado. WF537699 5/24